

CDDP + VNR		21-28日毎	
CDDP	80mg/m ²	day1	
VNR	20-25mg/m ²	day1,8	
CDDP + VNR + RT		28日毎	
CDDP	80mg/m ²	day1	
VNR	20mg/m ²	day1,8	
RT	60Gy/30回	週5回	
CBDCA(分割) + VNR		21-28日毎	
CBDCA	AUC::3	day1,8	Calvertの式を使用
VNR	25mg/m ²	day1,8	
低用量CBDCA + RT		42日間	
CBDCA	30mg/m ²	週5回	最初の20回投与 放射線の1時
RT	60Gy/30回	週5回	
wCBDCA + wPTX + RT		42日間	
CBDCA	AUC:2	day1,8,15,22,29,36	RT終了後3週間あけて、下記【w Calvertの式を使用
PTX	40mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	
RT	60Gy/30回	週5回	
wCBDCA + wPTX		21日毎	
CBDCA	AUC:5	day1	wCBDCA + wPTX + RT後3週あ Calvertの式を使用
PTX	200mg/m ²	day1	
CDDP + PEM		21日毎	
CDDP	75mg/m ²	day1	4コース後、増悪までPEMのみ継
PEM	500mg/m ²	day1	
CDDP + PEM + Bmab		21-28日毎	
CDDP	75mg/m ²	day1	4コース後、増悪までPEM + Bma
PEM	500mg/m ²	day1	
BV	15mg/kg	day1	
CBDCA + PEM		21日毎	
CBDCA	AUC::6	day1	4コース後、増悪までPEMのみ継 Calvertの式を使用
PEM	500mg/m ²	day1	
CBDCA + PEM + BV		21日毎	
CBDCA	AUC::5-6	day1	4コース後、増悪までPEM + Bma Calvertの式を使用
PEM	500mg/m ²	day1	
BV	15mg/kg	day1	
CBDCA + PTX + BV		21-28日毎	
CBDCA	AUC:6	day1	4-6コース後、増悪までBmabのみ Calvertの式を使用
PTX	200mg/m ²	day1	
BV	15mg/kg	day1	
CDDP + GEM		21日毎	
CDDP	80mg/m ²	day1	
GEM	1000mg/m ²	day1,8	
CBDCA + GEM		21日毎	
CBDCA	AUC::5	day1	Calvertの式を使用
GEM	1000mg/m ²	day1,8	
CDDP + DTX		21日毎	
CDDP	80mg/m ²	day1	

DTX	60mg/m ²	day1	
CBDCA + DTX		21-28日毎	
CBDCA	AUC:5	day1	Calvertの式を使用
DTX	60mg/m ²	day1	
CBDCA + triweekly PTX		21-28日毎	
CBDCA	AUC:6	day1	Calvertの式を使用
PTX	200mg/m ²	day1	
CBDCA + wPTX		28日毎	
CBDCA	AUC:6	day1	Calvertの式を使用
wPTX	70mg/m ²	day1,8,15	
CBDCA + weekly nab-PTX		21日毎	
CBDCA	AUC:6	day1	Calvertの式を使用
wnab-PTX	100mg/m ²	day1,8,15	
CDDP + S-1		28日毎	
CDDP	60mg/m ²	day1	
S-1	1回40mg/m ² 1日2回	day1-14	
RT	60Gy/30回	週5回 6週	
CDDP + UFT		28日毎	
CDDP	80mg/m ²	day8	
UFT	400mg/m ²	day1-14	BSA<1.25m ² 500mg/日(300-2)
CBDCA + S-1		21日毎	
CBDCA	AUC:5	day1	Calvertの式を使用
S-1	1回40mg/m ² 1日2回	day1-14	
DTX		21日毎	
DTX	60mg/m ²	day1	
DTX + Ram		21日毎	
DTX	60mg/m ²	day1	
Ram	10mg/kg	day1	
PEM		21日毎	
PEM	500mg/m ²	day1	
weekly nab-PTX		21日毎	
nab-PTX	100mg/m ²	day1,8,15	
VNR		21日毎	
VNR	25mg/m ²	day1,8	
GEM		21日毎	
GEM	1000mg/m ²	day1,8	
Bmab + erlotinib		21日毎	
BV	15mg/kg	day1	
イルロチニブ*	150mg	連日	
Ram + erlotinib		14日毎	
Ram	10mg/kg	day1	
イルロチニブ*	150mg	連日	
CBDCA + wnab-PTX + PEMBRO		21日毎	4コース後、増悪までPEMBROの

CBDCA	AUC:6	day1	Calvertの式を使用
w nab-PTX	100mg/m ²	day1,8,15	
ヘムブ [®] ロリス [®] マブ	200mg/body	day1	
CBDCA + w nab-PTX + atezolizumab		21日毎	4-6コース後、増悪までatezorizu Calvertの式を使用
CBDCA	AUC:6	day1	
w nab-PTX	100mg/m ²	day1,8,15	
アテゾリス [®] マブ	1200mg/body	day1	
CBDCA + PEM + PEMBRO		21日毎	4コース後、増悪までPEM + PEM Calvertの式を使用
CBDCA	AUC:5	day1	
PEM	500mg/m ²	day1	
ヘムブ [®] ロリス [®] マブ	200mg/body	day1	
CBDCA + PTX + BV + atezolizumab		21日毎	4-6コース後、増悪までBV + ate. Calvertの式を使用
CBDCA	AUC:6	day1	
PTX	175-200mg/m ²	day1	
BV	15mg/kg	day1	
アテゾリス [®] マブ	1200mg/body	day1	
キイトルーダ		21日毎	ヘムブ [®] ロリス [®] マブ 200mg/body day1
ヘムブ [®] ロリス [®] マブ	200mg/body	day1	
テセントリク		21日毎	アテゾリス [®] マブ 1200mg/body day1
アテゾリス [®] マブ	1200mg/body	day1	
オブジーボ		14日毎	Nivo 240mg/body day1
Nivo	240mg/body	day1	
オブジーボ		28日毎	Nivo 480mg/body day1
Nivo	480mg/body	day1	
オブジーボ + ヤーボイ		42日毎	オブジーボ 240mg/body day1.15.29 ヤーボイ 1mg/kg day1
オブジーボ	240mg/body	day1.15.29	
ヤーボイ	1mg/kg	day1	
オブジーボ + ヤーボイ		42日毎	オブジーボ 360mg/body day1.22 ヤーボイ 1mg/kg day1
オブジーボ	360mg/body	day1.22	
ヤーボイ	1mg/kg	day1	
オブジーボ + ヤーボイ + CBDCA + PTX		42日毎	オブジーボ 360mg/body day1.22 ヤーボイ 1mg/kg day1 CBDCA AUC=6 day1.22 PTX 200mg/m ² day1.22
オブジーボ	360mg/body	day1.22	
ヤーボイ	1mg/kg	day1	
CBDCA	AUC=6	day1.22	
PTX	200mg/m ²	day1.22	

間前に投与

CBDCA + wPTX】のレジメンを2コース行う

けて2コース

続

ibのみ継続

続

ibのみ継続

り継続

00)、BSA $\geq 1.25\text{m}^2$ 600mg/日(300-300)

み継続

mabのみ継続

IBROのみ継続

zorizumabのみ継続